

MÉMO COVID-19

LA VACCINATION PFIZER À L'OFFICINE

1. **Lavage des mains** avec une solution hydroalcoolique.

2. **Vérifier l'absence de particules étrangères** dans le flacon de vaccin COMIRNATY (PFIZER) et le solvant.
La solution du vaccin doit être blanchâtre

3. **Désinfecter l'ampoule et l'opercule du flacon** avec une compresse imbibée de solution antiseptique ou d'alcool à 70°C.

4. **Prendre une seringue** de 2 ou 3 ml et une aiguille 21 ou 23G.

5. **Prélever 1,8 ml de solvant** (Chlorure de sodium à 0,9%) et **l'injecter dans le flacon**.
Le flacon non reconstitué contient 0,45ml

6. **Équilibrer la pression du flacon** en aspirant **1,8 ml d'air** dans la seringue.

7. **Le flacon reconstitué contient 2,25 ml de vaccin.**

8. **Agiter doucement le flacon** (environ 10 fois).
Ne pas secouer.

9. **Étiqueter le flacon** en précisant la date et l'heure de la reconstitution (L'étiquette ne doit pas obstruer la visibilité du contenu)

Reconstitution

Contexte

- Dans le cadre d'un ralentissement des premières injections, les vaccins à ARNm COMIRNATY (PFIZER), seront désormais disponibles en ville.
- Cette évolution répond à une attente de la patientèle et va relancer la dynamique des vaccinations contre la COVID en officine.
- L'objectif d'une telle stratégie est de récupérer les patients hésitants en profitant de la proximité offerte par la pharmacie. Cette démarche s'inscrit également dans une politique globale liée à l'extinction progressive des centres de vaccination.

Populations Cibles

Le pharmacien est autorisé à administrer sans ordonnance le vaccin COMIRNATY (PFIZER) aux mêmes populations que celles éligibles en centre de vaccination.

Cela concerne donc **toutes les personnes âgées de 12 ans et plus.**

Réception & Conservation

- Les flacons étant décongelés lors de la livraison aux officines par les grossistes-répartiteurs **la conservation est de 30 jours.**
- Il faut **modifier la date limite d'utilisation dès réception en collant sur les flacons les étiquettes qui seront livrées par les grossistes-répartiteurs.**
- **Une reconstitution est nécessaire.**

Commande

- **Les commandes s'effectueront sur le portail de télédéclaration des ARS**, en indiquant le nombre de flacons souhaités :

<https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr>

1. **Lavage des mains** avec une solution hydroalcoolique.

2. **Vérifier la date et l'heure de reconstitution** du flacon de vaccin COMIRNATY (PFIZER).

3. **Agiter doucement le flacon**, puis vérifier l'absence de particules étrangères et/ou d'altération de l'aspect physique du produit.

4. **Désinfecter l'opercule** du flacon avec une compresse imbibée de solution antiseptique ou d'alcool à 70°C (temps de contact 1 min).

5. **Étiqueter les seringues** contenant le vaccin (nom du vaccin/numéro de lot/heure et date limite d'utilisation).

6. **Monter une aiguille d'une longueur adaptée** à la corpulence du patient (injection intramusculaire).

7. **Prélever 0,3 ml de vaccin.**

Le volume non extractible maximal est de 0,15 ml

8. **Déposer la seringue préparée sur un plateau.**

Les seringues peuvent être préparées en avance et conservées 6 heures après la reconstitution soit à température ambiante (sans dépasser 30°C), soit au réfrigérateur.

9. **Le flacon une fois percé peut être conservé au maximum 6 heures entre 2°C et 30°C.**

Le flacon est percé à partir de sa reconstitution

- Protocole de Préparation des doses -

