

# MÉMO COVID-19

## PAXLOVID – TRAITEMENT CONTRE LE COVID 19

### PRÉSENTATION (Source DGS urgent n° 2022-22)

- 1er médicament antiviral d'accès précoce à être prescrit et dispensé en médecine de ville pour les patients adultes sévèrement immunodéprimés ou présentant une pathologie à très haut risque et pour les patients de + de 65 ans présentant des risques de développer une forme grave de la COVID-19. Les premières boîtes sont déjà disponibles en Guadeloupe. Ce traitement à visée curative n'a pas vocation à remplacer la vaccination.
- **Uniquement** pour les patients âgés de **18 ans et plus** qui **réunissent en même temps les 3 conditions** suivantes :
  - ✓ TAG ou RT-PCR **positif**
  - ✓ **Pas de besoin d'oxygénothérapie**
  - ✓ Présentent un **risque important d'évoluer vers une forme grave** de la maladie
- Traitement à **prendre** obligatoirement **au plus tard 5 jours après le début des symptômes**.
- Si le TAG réalisé dans votre officine est positif et que le patient correspond aux facteurs de risques, parlez-lui de ce traitement invitez-le à contacter son médecin traitant

Selon les données disponibles:

↳ **du risque** de progression vers une **forme grave** (hospitalisation ou décès) **d'env. 85,2 %** après son administration.

### CONTRÔLE DE L'ÉLIGIBILITÉ / COMMANDE

- **Contrôler le code** barre d'identification unique du patient
- Contrôle d'éligibilité :
  - ✓ Âge **18 ans minimum**
  - ✓ TAG ou RT-PCR **positif**
  - ✓ **Le traitement commence** bien **maximum 5 jours après le début des symptômes**
  - ✓ **Absence de contre-indication** ou **d'interaction majeure** avec un traitement existant (adaptation de posologie des traitements en cours possible)  
**DANS TOUS LES CAS: CONSULTER LA NOTICE!**
    - Inscription sur la plateforme avec CPS du titulaire ou du gérant: [www.ap-paxlovid.com](http://www.ap-paxlovid.com)
      - Saisir le n° d'identification unique attribué au patient (indiqué sur l'ordonnance)
      - Scanner le code barre imprimé sur l'ordonnance.
    - Tutoriel de connexion permettant la création du compte : [https://www.ap-paxlovid.com/pdf/Pas%20%C3%A0%20pas\\_Saisie\\_Pharmacien.pdf](https://www.ap-paxlovid.com/pdf/Pas%20%C3%A0%20pas_Saisie_Pharmacien.pdf)
    - **Commander sur la plateforme** <https://www.ap-paxlovid.com/>  
Livraisons uniquement du lundi au samedi (non férié)
      - Si commande avant 11h : livraison dans la journée.
      - Si commande avant 18h : livraison le lendemain matin.
      - Décommissionnement assuré par le dépositaire.

#### Patients non éligibles si:

- Hospitalisés pour COVID ou pouvant être hospitalisés dans les 24h.
- Symptômes de COVID sévères (dyspnée au repos ou détresse respiratoire nécessitant une oxygénothérapie).
- Patients pas en capacité de recevoir le Paxlovid dans les 5 jours suivant les 1<sup>ers</sup> symptômes.
- Hypersensibilité connue à l'un des constituants
- Traitement concomitant avec médicament dont le métabolisme dépend fortement du CYP3A
- Traitement concomitant avec des médicaments qui sont de puissants inducteurs du CYP3A, la co-administration pouvant entraîner des concentrations plasmatiques significativement réduites de PF 07321332/ritonavir avec un risque de perte de réponse virologique et de résistance potentielle
- Patients suivant un essai clinique

### CONTRÔLE À RÉCEPTION

- **Repérer le n° d'identification** du patient (étiquette sur le colis)
- **Inscrire ce n° sur la boîte** de médicament
- **Informé le patient de l'arrivée** de son traitement
- **Scanner le code barre de l'ordonnance** ou du bordereau de commande

### CONSERVATION

Température ambiante (max 25°C)  
NE PAS CONGELER  
NE PAS STOCKER AU RÉFRIGÉRATEUR




# MÉMO COVID-19

## PAXLOVID – TRAITEMENT CONTRE LE COVID 19

### DISPENSATION

- Vérifier que le **déla**i maximum de 5j suivant l'apparition des symptômes est bien respecté
- Informer le patient (notice)
  - ✓ Lui **dire de déb**uter le traitement le plus rapidement possible
  - ✓ Lui **rapp**eler l'importance de respecter strictement la **posologie**
  - ✓ En cas d'effet indésirable ou situation particulière comme une grossesse par exemple : déclarer sur [www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)
  - ✓ Scanner le code barre et renseigner date de délivrance et n° de lot
- En cas de non-délivrance du traitement:
  - ✓ L'indiquer sur la fiche patient,
  - ✓ Garder la boîte dans les conditions définies pour un autre patient
  - ✓ Reporter le numéro d'identification sur la fiche du 2nd patient.
  - ✓ Au besoin : Santé Publique France peut récupérer la boîte



### FACTURATION (TARIFS GUADELOUPE)

RÉMUNÉRATION GUADELOUPE	Prix HT	Prix TTC
Dispensation	11,95 €	12,20 €
Honoraire à la boîte	1,32 €	1,35€
Honoraire de dispensation	0,66 €	0,68€
+ Honoraire lié à l'âge (>70 ans)	1,98 €	2,09 €

#### Calcul rémunération :

18-69 ans :

11,95 + 1,32 + 0,66 = **13,93 € HT**  
**(14,22€ TTC)**

Plus de 70ans :

11,95 + 1,32 + 0,66 + 1,98 = **15,92 € HT**  
**(16,31 € TTC)**

Code CIP :

34009  
3024551 4  
Prise en charge 65 %

#### POSOLOGIE & MODE D'ADMINISTRATION :

- 300 mg de PF-07321332 (2 comprimés roses + 100 mg de ritonavir (1 comprimé blanc)
- Par voie orale toutes les 12h pendant 5j.
- Les comprimés doivent être pris ensemble, avec ou sans nourriture.
- Ils doivent être avalés entiers sans être coupés, mâchés ou écrasés.

Recommandations HAS : [https://www.has-sante.fr/jcms/p\\_3311133/fr/paxlovid-pf-07321332/ritonavir](https://www.has-sante.fr/jcms/p_3311133/fr/paxlovid-pf-07321332/ritonavir)

ANSM : <https://ansm.sante.fr/tableau-atu-rtu/paxlovid-150-mg-100-mg-comprimes-pellicule>

N° d'appel pour toute question :

0 805 987 949 Service & appel gratuits

#### PRÉCAUTIONS D'USAGE :

##### INSUFFISANCE RÉNALE :

Légère : pas d'adaptation de la posologie

Modérée : 150 mg de PF-07321332 (1 comprimé rose) + 100 mg de ritonavir (1 comprimé blanc)

Sévère : PAS D'ADMINISTRATION

##### INSUFFISANCE HÉPATIQUE :

Légère ou modérée : pas d'adaptation de la posologie

Sévère : PAS D'ADMINISTRATION

Femmes enceintes ou en âge de procréer n'utilisant pas de moyen de contraception: **NON RECOMMANDÉ** (contraception hormonale : à combiner avec autre moyen (notamment préservatif) car le traitement peut baisser l'efficacité du contraceptif hormonal)

Interrompre l'allaitement pendant la durée du traitement et pendant 7j après l'arrêt du traitement.

